

भण्डारण

काटिएका फलहरू को गुणस्तर नबिग्रिनको लागि रातभरको लागि कोठाको तापक्रम कम भएको ठाउँमा तीन-चार दिनसम्म राख्न सकिन्छ र यसको बजारको मूल्य राम्रो हुन्छ । **प्रशोधन (Processing)**

कतिताउँमा कृषकहरूले फललाई टुक्रा बनाएर राख्ने पनि गर्दछन् ताकि भविष्यमा त्यसको सदुपयोग या तरकारीको लागि पनि राख्ने गर्दछन् । फलको टुक्राहरू घाममा पूर्ण रूपले सुकेको हुनुपर्छ ताकि चिसोको कुनैपनि रोगहरू नलागुन । सुकेका फलका टुक्राहरूलाई डल्ले खोरसानी सँग मिश्रण गरेर बोटलमा हाली अच्छार पनि बनाउने ग

Published by

Department of Horticulture, Sikkim University
6th Mile Tadong, Gangtok District, 737102
lsharma@cus.ac.in

Under the project

Conservation, Promotion and Intensification of Local Crop
Landraces or Germplasm for Livelihoods of Organic Farmers
in Sikkim

Sponsored by:

NATIONAL MISSION ON ORGANIC MISSION
Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of India
NMHS Nodal Institute: G.B. Pant National Institute of Himalayan
Environment & Sustainable Development (GBPNIHESD)

Cite: Limbu S and Sharma L. 2020. Cultivation
practices of Sano Bihi (African Eggplant) (Pamphlet).
Department of Horticulture, Sikkim University.



Extension Bulletin-01/NMHS/2020

सानो बिहीँको खेति



Authors

Suren Limbu and Laxuman Sharma

Department of Horticulture, Sikkim University
6th Mile Tadong, Gangtok District, 737102
lsharma@cus.ac.in

परिचय

सानो बिहीं (*Solanum aethiopicum*) Solanaceae परिवारसँग सम्बन्धित, सिक्किमको तल्लो र मध्य पहाडहरूमा पर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण तरकारी सब्जी हो । यो सब्जी राज्यको ग्रामीण क्षेत्रमा लगभग हरेक घरमा पाइन्छ । यो सब्जीको फल आर्थिक उत्पादनको लागि राज्यामा प्रख्यात छ । यसलाई या त एकलै पकाइन सकिन्छ वा अन्य तरकारीहरूसँग पनि मिसाएर पकाइन सकिन्छ । विभिन्न जैविक, रसायनिक र औषधीय गुण भएको सब्जी मध्ये यो एक हो र स्थानीय बजारमा यसको राम्रो मूल्यमा बिक्री हुन्छ ।

जमिनको तयारी

उच्च प्राङ्गारिक पदार्थ भएको माटो यसको खेतीका लागि उपयुक्त हुन्छ । रोपेको ठाउँमा पानी जमिनु भएन । यसको बिरुवालाई भिरालो ठाउँहरूमा पनि रोप्न सकिन्छ तर बिरुवाहरू पूर्ण रूपमा सूर्यको सम्पर्कमा हुनुपर्छ । एकखेप जोतेको बारीमा पनि यस सब्जीको बिरुवालाई लगाउन सकिन्छ तर जमिनमा पूर्ण रूपले निकासको व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

प्रसारण (Propagation)

सानो बिहीं बीउ द्वारा यसको प्रसारण गरिन्छ । ठूलो आकारको फल जसमा कुनै रोग र किराहरू नागेको फललाई बीउको लागि राखिन्छ । जसरी बैगुनको बीउ राखिन्छ त्यसरीनै सानो बिहींको पनि बीउ राख्ने गरिन्छ । उचित बीउ राख्ने समय मार्च देखि अप्रिल हो र त्यसको एक महिना बादमा बारीमा सारिन्छ । ६०x६० cm को दुरीमा बारीमा बिरुवा लगाइन्छ वा रोपिन्छ । सामान्य सम्म भएको जमीनमा यसको बिरुवालाई रोपिन्छ तर ड्याडग उठाएर रोपेको बिरुवालाई सर्न अलिक सजिलो पर्छ ।

मलखाद व्यवस्थापन

सिक्किमको परिस्थितिमा हेर्दा अहिले सम्म कृषकहरूले सानो बिहींको लागि कुनै पनि मलखादको सिफारीष गरिएको छैन यसैले बैगुन रोप्ने तरिका नै अपनाएको छ । जस्तै गाईको

मल (FYM) @ 25 क्विन्टल प्रति हेक्टर प्रयोग गरिन्छ साथै गाईको मलको कुल खुराक जमीन तयार गर्दा प्रयोग गरिन्छ र गाईको मलको साटो कुखुराको मल पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । गँड्यौलाको मल बिरुवा रोपेको एक महिना बादमा १००-१५० ग्राम एउटा बिरुवामा प्रयोग गरिन्छ । अनुसन्धानको अनुसार गाईको मल @ 10 t/ha + VC @ 2 t/ha + AMC (Arka Microbial Consortiun) सबैभन्दा राम्रो उपजको लागि प्रयोग गरिन्छ ।

सिँचाइ

पानीको कम प्रयोगमा पनि सानो बिहींको खेती गर्न सकिन्छ । बिरुवा रोप्ने बित्तिकै एक खेप पानी हाल्नु आवश्यक छ त्यसपश्चात हप्तामा दुई खेप पानी लगाउनु पर्छ । बिरुवा बढ्दै गएपछि हप्तामा एकखेप पानी हाल्दा हुन्छ । फूल फुल्दा र फल लाग्दा खेरी पानीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ ।

कीरा र रोगहरू

बिरुवामा प्रमुख कीराहरू लाग्ने भनेको Shoot and Fruit Borer अनि Leaf Weber हो । किरा लागेको बिरुवालाई या पातहरूलाई टिपेर फ्याक्यौं भने रोगहरूबाट बचाउन सकिन्छ । ग्रीन हाउसमा रोपेको बालीलाई विशेष गरी लाही (aphids), thrips अनि सेतो पुतली लाग्ने गर्दछ ।

फसल टिप्ने

बिरुवा रोपेको ४०-४५ दिन देखि उता पहिलोपल्ट फल टिप्न योग्य हुन्छ । ठूला र समान आकारका फलहरू बजारीकरणका लागि उपयुक्त हुन्छन् । रोग लागेका, बिग्रेका र कुइएका फलहरूलाई छुट्याएर फालिन्छ ।

उपज (Yields)

जब बिरुवाहरू उचित रूपमा खेती गरिन्छ र इष्टतम स्तरको मल र स्पेसिडमा, बिरुवाहरूले 15-20 टन / हेक्टरको औसत उत्पादन दिन सक्छन् ।