

फसल काटने र उपचार

जब सबैभन्दा माथिको अलैंचीको कोसा खैरो र कालो हुन्छ, यो कटाईको लागि सही समय हो । कोसा लाग्ने बोटहरू 35-45 cm को उचाइमा काटिन्छ र पूर्ण परिपक्वताको लागि 10-15 दिनको लागि छोडिन्छ । फसल काटिसकेपछि यसलाई सुकाइन्छ ताकि कोसामा चिसो नमीपन नहोस । परम्परागत रूपमा भट्टीमा अलैंचीका कोसाहरूलाई तातो धुँवाले सुकाइन्छ । यसो गर्नाले गाढा खैरो रङ्गमा कोसाहरू परिणत हुन्छन् जुन बजारमा कम प्राथमिकता छ । कृषकहरूलाई ICRI परिमार्जित भट्टी को उपचार को लागी प्रयोग गर्न सल्लाह दिएको छ ।

Published by

Department of Horticulture, Sikkim University
6th Mile Tadong, Gangtok District, 737102
lsharma@cus.ac.in

Under the project

Conservation, Promotion and Intensification of Local Crop
Landraces or Germplasm for Livelihoods of Organic Farmers
in Sikkim

Sponsored by:

NATIONAL MISSION ON ORGANIC MISSION
Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of India
NMHS Nodal Institute: G.B. Pant National Institute of Himalayan
Environment & Sustainable Development (GBPNIHESD)

Cite: Sharma K N, Limbu S, Sharma L and Sherpa P.
2020. Cultivation practices of Large Cardamom
(Pamphlet). Department of Horticulture, Sikkim
University.



Extension Bulletin-07/NMHS/2020

ठूलो अलैंचीको खेति



Authors

Khom Nath Sharma, Suren Limbu,
Laxuman Sharma and Pema Sherpa

Department of Horticulture, Sikkim University
6th Mile Tadong, Gangtok District, 737102
lsharma@cus.ac.in

परिचय

ठूलो अलैंची (*Amomum subulatum* Roxb), Zingiberaceae परिवारको सदस्य हो । यो मुख्य नगदी बाली मध्ये एक हो जुन उप हिमालय राज्य सिक्किम र पश्चिम बंगालको दार्जिलिङ जिल्लामा खेती गरिन्छ । सिक्किम भारतको ठूलो अलैंचीको सबैभन्दा ठूलो उत्पादक राज्य हो । उत्तराखण्डको केही भागमा र केही अन्य उत्तर पूर्वी पहाडी राज्यहरूमा पनि यसको खेती गरिन्छ । नेपाल र भुटान अन्य दुई हिमालयी देशहरूमा पनि यसको खेती गरिन्छ । अलैंची बाह्रमास हरियो हुने बिरुवा हो । यसको फूल पहेंलो हुन्छन् र सामान्यतया भमराहरूले गर्दा प्रजनन हुने गर्दछ ।

हावापानी र माटो

यो बाली 1000-2000 मिटर उचाइमा 3000-3500 मिलिमिटर प्रति वर्ष वर्षाको साथ वन रूपहरूको छायामा राम्रोसँग बढ्छ । गहिरो र राम्रो निकास भएको माटो अलैंचीका लागि उपयुक्त हुन्छ । प्रायजसो अलैंचीको बिरुवा भिरालो भूभागमा उब्जाउन सकिन्छ, तर मध्यम ढलान भएको जमिनलाई प्राथमिकता दिइन्छ । बिरुवाहरू सामान्यतया झोराहरू (साना मुहानहरू) छेउमा हुर्किन्छन् । पहाडी खोलाको ओसिलो र छायादार छेउमा र पहाडी ढलानमा गहिरो र राम्रो निकास भएको माटोमा राम्रो फल्छ ।

मलखाद (Nutrient Management)

सिक्किमका किसानहरूले प्रायः प्रत्यारोपणको समयमा मात्र पोषक तत्वहरू प्रयोग गर्छन् । दिगो उत्पादकत्वका लागि अप्रैल महिनामा ४-५ केजीमा राम्ररी कुएको गाईको मल हाल्न आवश्यक पर्दछ ।

जग्गा तयारी

विशेष गरी रोप्ने जग्गालाई सफा गरी सिँचाई प्रणाली, कम्पोष्टपिट बनाइएको हुन्छ अनि क्युरिड युनिट (भट्टी) बलीकै छेउछाउमा बनाइएको हुन्छ । मनसुन सुरु हुनु अघि 30 cm³ खाडल खनेको हुनुपर्छ अनि खाडलमा माटो र गाईको मल (FYM) को मिश्रण गरी हाल्नुपर्छ ।

बिरुवा रोप्ने उपयुक्त समय मई र जुलाई महिना हो । बिरुवा रोप्ने समयमा बिरुवा छान्दा एउटा अलिक छिपिएको हाँगा अनि एक देखि दुईटा कलिला मुनाहरू निस्किएको बिरुवा सार्न योग्य हुन्छ । बिरुवा रोप्दा बेसी गाड्नु हुँदैन । बिरुवा रोपिसकेर एउटा थाङ्ग्राले सहयोग दिनुपर्छ अनि पात-पतिङ्गरहरूले रोपेको ठाउँमा छोपिदिए माटोको नमीपन कायम रहन्छ औ छिट्टो सँग बिरुवा जाग्न सफल हुन्छ ।

नर्सरी व्यवस्थापन

अलैंची प्रसरण प्रायजसो बीउ वा यसको कलिला मुनासँगैका जरा भएका बिरुवाबाट सारिन्छ । नर्सरीको लागि फेदको र बीचबाट अलैंचीका कोसाहरू चयन गरिन्छ । यसको बीउ सेप्टेम्बर-अक्टोबरमा रोपिन्छ । बीउ राख्दा ड्याङ्गमा 10 cm को दूरीमा छरिन्छ । ड्याङ्गमा पातपतकरहरूले छोपिदिनुपर्छ । बीउ रोपेको २५-३० दिन बादमा उम्रने गर्दछ । जब बिरुवाहरू 3-4 पातको चरणमा पुग्छन्, तिनीहरूलाई माध्यमिक नर्सरीमा प्रत्यारोपण गरिन्छ वा बिरुवाहरू माटो, बालुवा र गाईको मलले भरिएको पोलीब्यागमा रोपिन्छ । जब बिरुवा 45-60 cm को उचाईमा हुन्छ अनि 2-3 वटा सम्म हाँगा निस्किएको हुन्छ तब यसलाई जमीनमा सारिन्छ ।

गोडमेल

नोभेम्बर-मार्चको समयमा सुख्खा हुने भएकोले यसली सिँचाई द्वारा माटोलाई नमी बनाउनु पर्ने हुन्छ । यो बाली ओझेलमा फस्टाउने भएको कारणले गर्दा यसलाई ओझेलको आवश्यकता पर्दछ । बाली खेतमा छायाका लागि प्रयोग हुने रुखहरू पानीसाज, अर्गेल्ली, असारे, उत्तीस, चिलौने आदि हुन्, तर बढी छायाबाट बच्न छायाँका रुखका हाँगाहरू छाँट्नु आवश्यक हुन्छ । झारपातको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि वर्षमा कम्तीमा तीनवटा झारपात उखेल्ने गरिन्छ । झारपात पछि, सुकेका पातहरू र अन्य थोपा सामग्रीहरू बिरुवाको आधार वरिपरि मलचको रूपमा प्रयोग गरिन्छ । फूल फुल्ने क्रममा, यो सुनिश्चित गर्नुपर्दछ कि झारपात वा अन्य पात-पतिङ्गरहरूले फुललाई छोप्न दिनु हुँदैन ।